

Le microplancton de l'Ordovicien moyen de Strabla (Pologne)

Hanna Górká

Acta Palaeontologica Polonica 25 (2), 1980: 261-277

Le microplancton de l'âge ordovicien moyen provient du sondage de Strabla situé dans la dépression de Podlasie, dans la région occidentale de la Plate-forme orientale-européenne. Ce sont les Acritarches parmi lesquels on 'a décrit 3 nouveaux genres: *Duplicisphaeridium* n. gen., *Palaiosphaeridium* n. gen. et *Strablosphaeridium* n. gen. et 5 nouvelles espèces *Baltisphaeridium pseudocalicispinum* sp. n., *B. vieslavi* sp. n., *Goniosphaeridium goerani* sp. n., *Palaiosphaeridium francinae* n. gen. sp. n. *Strablosphaeridium biparietalis* n. gen. sp. n. et une nouvelle combinaison: *Duplicisphaeridium spinigerum* (Górká) n. comb. On a présenté la répartition géographique et stratigraphique des espèces étudiées et leur corrélation avec le domaine baltique.

Key words: Acritarches, Ordovicien, systématique, morphologie. corrélation stratigraphique.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

 [Full text \(1,165.9 kB\)](#)